

Impfplan für Kinder und Jugendliche (gemäß STIKO - Ständige Impfkommission 1,2)

Impfungen gegen	Vollendeter Lebensmonat (2)					Vollendetes Lebensjahr (2)	
	2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-17
Grundimmunisierung* – Diphtherie – Tetanus – Keuchhusten – Hepatitis B – Kinderlähmung – Haemophilus influenzae Typ b (Hib)	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung	4. Impfung		Auffrischimpfung – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten	Auffrischimpfung – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten – Kinderlähmung
Pneumokokken	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung	4. Impfung			
Grundimmunisierung** – Masern – Mumps – Röteln – Varizellen				1. Impfung	2. Impfung (4, 5, 6)		Impfung (5, 7) – Varizellen
Meningokokken (8)					Impfung ab dem vollendeten 12. Lebensmonat (3)		
Hepatitis B							Grundimmunisierung (9)
HPV (Typen HPV 16, 18)							Grundimmunisierung (10)

(Mit Dank entnommen aus „Gesundes Kind“)

* mögl. mit 6fach-Kombinationsimpfstoff

** mögl. mit 4fach-Kombinationsimpfstoff

1 Gemäß den Impfeempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand Juli 2006, Quelle: Epidemiologisches Bulletin 30/2006 und Ergänzung, Robert Koch-Institut

2 Versäumte Impfungen sollten möglichst bald nachgeholt werden

3 Gleichbedeutend mit dem Beginn des folgenden Lebensmonats/- jahres

4 Mindestabstand zwischen den Impfungen 4 Wochen

5 Impfung entsprechend Herstellerangaben

6 Zweite VZV-Impfung bei Verwendung eines 4fach-Kombinationsimpfstoffs erforderlicher Abstand

zwischen beiden Dosen 4-6 Wochen

7 Ungeimpfte ohne durchgemachte Windpockenerkrankung

8 Nicht gleichzeitig mit Pneumokokkenkonjugat-/ MMR-/ VZV-/ MMRV-Impfstoff

9 Grundimmunisierung für bisher nicht geimpfte Kinder und Jugendliche

10 Standardimpfung für Mädchen - Grundimmunisierung mit 3 Dosen für alle Mädchen im Alter von 12 - 17 Jahren