

# AUFKLÄRUNGSMERKBLATT

Zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) – mit mRNA-Impfstoffen – (Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von Moderna)

Name der zu impfenden Person \_\_\_\_\_  
(bitte in Druckbuchstaben)  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

## Was ist COVID-19?

Coronaviren sind seit Jahrzehnten bekannt. Seit dem Jahreswechsel 2019 / 2020 zirkuliert weltweit ein neuartiges Coronavirus, das SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), welches der Erreger der Krankheit COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) ist.

Zu den häufigen Krankheitszeichen von COVID-19 zählen trockener Husten, Fieber, Atemnot sowie ein vorübergehender Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes. Auch ein allgemeines Krankheitsgefühl mit Kopf- und Gliederschmerzen, Halsschmerzen und Schnupfen wird beschrieben. Seltener berichten Patienten über Magen-Darm-Beschwerden, Bindehautentzündung und Lymphknotenschwellungen. Folgeschäden am Nerven- oder Herz-Kreislaufsystem sowie langanhaltende Krankheitsverläufe sind möglich. Obwohl ein milder Verlauf der Krankheit häufig ist und die meisten Erkrankten vollständig genesen, kommen auch schwere Verläufe beispielsweise mit Lungenentzündung vor, die zum Tod führen können. Insbesondere Kinder und Jugendliche haben zumeist milde Krankheitsverläufe; schwere Verläufe sind in dieser Altersgruppe selten und kommen meist bei bestehenden Vorerkrankungen vor.

Neben dem Vermeiden einer Infektion durch Beachtung der AHA + A + L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltag mit Maske, Corona-WarnApp herunterladen, regelmäßiges Lüften) bietet die Impfung den bestmöglichen Schutz vor einer Erkrankung.

## Um welchen Impfstoff handelt es sich?

Es sind mehrere Impfstoffe gegen COVID-19 zugelassen, die geeignet sind, um sich individuell vor COVID-19 zu schützen und die Pandemie zu bekämpfen. Die hier besprochenen mRNA-COVID-19-Impfstoffe (Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von Moderna) sind genbasierte Impfstoffe, die auf der gleichen neuartigen Technologie beruhen. Weitere mRNA Impfstoffe werden geprüft, sind aber derzeit noch nicht zugelassen.

mRNA (Boten-RNA oder messenger Ribonukleinsäure) ist die „Bauanleitung“ für jedes einzelne Eiweiß des Körpers und ist nicht mit der menschlichen Erbinformation – der DNA – zu verwechseln. In den mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 ist eine „Bauanleitung“ für einen einzigen Baustein des Virus (das sogenannte Spikeprotein) enthalten. Die COVID-19- mRNA-Impfstoffe enthalten keine vermehrungsfähigen Impfviren, d.h. geimpfte Personen können auch keine Impfviren auf andere Personen übertragen. Die in den Impfstoffen enthaltene mRNA wird nach der Impfung nicht ins menschliche Erbgut eingebaut, sondern nach Eintritt in die Zellen (vor allem in Muskelzellen an der Impfstelle und in bestimmten Abwehrzellen) „abgelesen“, woraufhin diese Zellen dann das Spikeprotein selbst herstellen. Die so vom Körper des Geimpften gebildeten Spikeproteine werden vom Immunsystem als Fremdeiweiße erkannt; in der Folge werden Antikörper und Abwehrzellen gegen das Spikeprotein des Virus gebildet. So entsteht eine schützende Immunantwort. Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird im Körper nach einigen Tagen abgebaut. Dann wird auch kein Viruseiweiß (Spikeprotein) mehr hergestellt.

## Wie wird der Impfstoff verabreicht?

Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt. Der Impfstoff muss 2-mal verabreicht werden. Zwischen der 1. und 2. Impfung sollten 3 bis 6 Wochen (Comirnaty®) bzw. 4 bis 6 Wochen (Spikevax®) liegen. Bei der 2. Impfung soll gegenwärtig der gleiche Impfstoff desselben Herstellers verwendet werden wie bei der 1. Impfung. Eine Ausnahme gilt bei Personen, bei denen bei der 1. Impfung der COVID-19-Vektor-Impfstoff Vaxzevria® von AstraZeneca verwendet wurde.

Angiologie · Allergologie · Arbeitsmedizin · Chirurgie · Diabetologie · Ernährungsmedizin  
Gastroenterologie · Gerontologie · Hausärztliche Versorgung · Hypertonie Zentrum  
Innere Medizin · Kardiologie · Notfallmedizin · Psychotherapie · Sportmedizin

Centrum für Kardiologie,  
Angiologie und  
Diabetologie  
Rhein - Main

Dr. med. Predrag Matic  
Innere Medizin, Kardiologie und  
Diabetologie

Dr. med. Stephan Bauer  
Innere Medizin und Kardiologie

**PRAXIS MATIC**  
Akademische Lehrpraxis  
der  
Johann Wolfgang Goethe  
Universität  
Frankfurt am Main

Dr. med. Nina  
Matic Allgemeinmedizin

Dr. med. Vera Marbun  
Innere Medizin

Gabriele Kehl  
Innere Medizin und  
Rheumatologie

Dr. med. Juliane Rohlf  
Allgemeinmedizin und Chirurgie

Dr. med. Ludmila Bogatyrova  
Allgemeinmedizin und Geriatrie

M. Sc. Vera Wagner  
Psychologische Psychotherapie

Dipl. Psych. Ana Seiwald  
Psychologische Psychotherapie

Dr. med. Sandra Schanz  
Allgemeinmedizin und Anästhesie

Ingrid Strotmann  
Allgemeinmedizin und  
Öffentliches Gesundheitswesen

[www.praxis-matic.de](http://www.praxis-matic.de)

MVZ Darmstadt  
Gruberstr. 26  
64289 Darmstadt  
Tel.: 06151/97172-0  
Fax.: 06151/97172-119  
info@praxis-matic.de

Psychotherapie  
Borsdorfstr. 42  
64289 Darmstadt

MVZ Rossdorf  
Darmstädterstr. 8  
64389 Rossdorf  
Tel.: 06154/695174  
Fax.: 06154/695172  
rossdorf@praxis-matic.de

MVZ Offenbach Mühlheim  
Südring 14  
63165 Mühlheim  
Tel.: 06108/9111-0

Für diese Personen empfiehlt die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut (STIKO) zurzeit, die 2. Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® oder Spikevax®) mindestens 4 Wochen nach der 1. Impfung mit Vaxzevria® durchzuführen. Grund für diese Empfehlung ist die laut aktuellen Studienergebnissen überlegene Immunantwort nach dieser sogenannten heterologen Impfsreihe (1. Impfung mit Vaxzevria® gefolgt von 2. Impfung mit Comirnaty® oder Spikevax®) gegenüber der homologen Impfsreihe mit Vaxzevria® (1. und 2. Impfung mit Vaxzevria®). Die Immunantwort nach dieser heterologen Impfsreihe (1. Impfung mit Vaxzevria® gefolgt von 2. Impfung mit Comirnaty® oder Spikevax®) ist nach diesen Studienergebnissen mit der Immunantwort nach zwei Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® oder Spikevax®) vergleichbar. Zudem kann mit dem kürzeren Impfabstand bei dieser heterologen Impfsreihe (1. Impfung mit Vaxzevria® gefolgt von 2. Impfung mit Comirnaty® oder Spikevax®) nach mindestens 4 Wochen) eine vollständige Immunisierung in einem kürzeren Zeitrahmen erreicht werden. Studienergebnisse deuten auch darauf hin, dass die Nebenwirkungen dieser heterologen Impfsreihe (1. Impfung mit Vaxzevria® gefolgt von 2. Impfung mit Comirnaty® oder Spikevax®) mit den hier im Folgenden dargestellten vergleichbar sind. Impfung nach nachgewiesener Infektion Personen, die eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus durchgemacht haben, sollen zurzeit lediglich 1 Impfstoffdosis erhalten, sofern bei ihnen keine Immunschwäche vorliegt. Ist die Infektion mit Krankheitszeichen einhergegangen, soll die Impfung in der Regel 6 Monate nach der Erkrankung erfolgen, frühestens jedoch 4 Wochen danach. Bei einer Infektion ohne Krankheitszeichen kann die Impfung ab 4 Wochen nach der Diagnose erfolgen. Auch in Fällen, in denen seit der Diagnosestellung mehr als 6 Monate vergangen sind, reicht 1 Impfstoffdosis aus. Ob und wann bei diesen Personen später eine 2. Impfstoffdosis notwendig ist, lässt sich derzeit laut STIKO noch nicht sagen. Bei Personen, bei denen nach der 1. Impfstoffdosis eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sicher nachgewiesen wurde, sollte laut STIKO-Empfehlung die 2. Impfstoffdosis in der Regel 6 Monate nach Genesung bzw. nach der Diagnose verabreicht werden, frühestens jedoch 4 Wochen danach. Es gibt keine Hinweise, dass die Impfung eine Gefährdung darstellt, wenn man in der Vergangenheit eine Infektion durchgemacht hat. Auffrischimpfungen mit mRNA-Impfstoffen (Comirnaty® oder Spikevax®) Personen, bei denen nach einer vollständigen Impfung möglicherweise keine ausreichende oder eine schnell nachlassende Immunantwort vorliegt, wird eine Auffrischimpfung bzw. eine weitere Impfung im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge angeboten. Zu diesen Personen gehören insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen, Personen mit einer Immunschwäche oder Immunsuppression sowie pflegebedürftige Menschen in ihrer eigenen Häuslichkeit und Menschen ab 80 Jahren. Auch Personen, die eine vollständige Impfsreihe mit einem Vektor-Impfstoff erhalten haben, wird im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge eine weitere Impfung angeboten: Dies betrifft Personen, die 2 Impfstoffdosen Vaxzevria® von AstraZeneca oder 1 Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen® von Janssen Cilag International / Johnson&Johnson oder die 1 Impfstoffdosis eines Vektor-Impfstoffs nach einer nachgewiesenen Infektion mit dem neuartigen Coronavirus erhalten haben. Die Auffrischimpfung bzw. zusätzliche Impfung wird mit einer 1-maligen Impfstoffdosis mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe (Comirnaty® oder Spikevax®) frühestens 6 Monate nach Abschluss der ersten Impfsreihe durchgeführt. Bislang liegen nur beschränkt Erkenntnisse aus Studien und noch kein Beschluss der STIKO direkt zu Auffrischimpfungen mit COVID-19-Impfstoffen vor. Auf der Grundlage allgemeiner wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Impfstoffen wird davon ausgegangen, dass die Wirkung und Nebenwirkungen dieser Auffrischimpfung mit den hier im Folgenden dargestellten vergleichbar sind.

### Wie wirksam ist die Impfung?

Die verfügbaren COVID-19-mRNA-Impfstoffe sind hinsichtlich der Wirksamkeit und auch der möglichen Impfreaktionen und Komplikationen vergleichbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand bietet eine vollständige Impfung mit COVID-19-mRNA-Impfstoffen bei Personen ab 16 Jahren (Comirnaty®) bzw. bei Personen ab 18 Jahren (Spikevax®) eine hohe Wirksamkeit von etwa 95%. Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, war bei den vollständig gegen COVID-19 geimpften Personen um etwa 95% geringer als bei den nicht geimpften Personen. Die Wirksamkeit in Bezug auf die Verhinderung einer schweren COVID-19-Erkrankung (also zum Beispiel einer Behandlung im Krankenhaus) war etwa 85%. Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass die Impfstoffe auch schwere Erkrankungen durch derzeit bekannte Virusvarianten mit vergleichbarer Wirksamkeit verhindern können.

Angiologie · Allergologie · Arbeitsmedizin · Chirurgie · Diabetologie · Ernährungsmedizin  
Gastroenterologie · Gerontologie · Hausärztliche Versorgung · Hypertonie Zentrum  
Innere Medizin · Kardiologie · Notfallmedizin · Psychotherapie · Sportmedizin

**Centrum für Kardiologie,  
Angiologie und  
Diabetologie  
Rhein - Main**

**Dr. med. Predrag Matic**  
Innere Medizin, Kardiologie und  
Diabetologie

**Dr. med. Stephan Bauer**  
Innere Medizin und Kardiologie

**PRAXIS MATIC**  
**Akademische Lehrpraxis**  
der  
Johann Wolfgang Goethe  
**U n i v e r s i t ä t**  
Frankfurt am Main

**Dr. med. Nina Matic**  
Allgemeinmedizin

**Dr. med. Vera Marbun**  
Innere Medizin

**Gabriele Kehl**  
Innere Medizin und  
Rheumatologie

**Dr. med. Juliane Rohlf**  
Allgemeinmedizin und Chirurgie

**Dr. med. Ludmila Bogatyrova**  
Allgemeinmedizin und Geriatrie

**M. Sc. Vera Wagner**  
Psychologische Psychotherapie

**Dipl. Psych. Ana Seiwald**  
Psychologische Psychotherapie

**Dr. med. Sandra Schanz**  
Allgemeinmedizin und Anästhesie

**Ingrid Strotmann**  
Allgemeinmedizin und  
Öffentliches Gesundheitswesen

[www.praxis-matic.de](http://www.praxis-matic.de)

**MVZ Darmstadt**  
Gruberstr. 26  
64289 Darmstadt  
Tel: 06151/97172-0  
Fax.: 06151/97172-119  
[info@praxis-matic.de](mailto:info@praxis-matic.de)

**Psychotherapie**  
Borsdorfstr. 42  
64289 Darmstadt

**MVZ Rossdorf**  
Darmstädterstr. 8  
64389 Rossdorf  
Tel.: 06154/695174  
Fax.: 06154/695172  
[rossdorf@praxis-matic.de](mailto:rossdorf@praxis-matic.de)

**MVZ Offenbach Mülheim**  
Südring 14  
63165 Mülheim  
Tel.: 06108/9111-0

Das bedeutet: Wenn eine mit einem COVID-19-Impfstoff vollständig geimpfte Person mit dem Erreger in Kontakt kommt, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken. Wie lange dieser Impfschutz anhält, ist derzeit noch nicht bekannt. Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren: In klinischen Studien zeigte eine vollständige Impfung mit Comirnaty® bei 12- bis 15-Jährigen bzw. mit Spikevax® bei 12- bis 17-Jährigen eine Wirksamkeit gegenüber einer COVID-19-Erkrankung von bis zu 100 %. Bei beiden mRNA-Impfstoffen ist davon auszugehen, dass die Wirksamkeit in Bezug auf eine schwere COVID-19-Erkrankung ähnlich hoch ist. Auch wenn Sie bzw. Ihr Kind geimpft sind, ist es notwendig, dass Sie weiterhin die AHA + A + L-Regeln beachten und somit sich und Ihre Umgebung schützen. Gründe dafür sind, dass der Schutz nicht sofort nach der Impfung einsetzt und auch nicht bei allen geimpften Personen gleichermaßen vorhanden ist. Zudem können geimpfte Personen das Virus (SARSCoV-2) weiterverbreiten, auch wenn das Risiko im Vergleich zu ungeimpften Personen deutlich vermindert ist.

### Wer sollte gegen COVID-19 geimpft werden?

Comirnaty® und Spikevax® sind für Personen ab 12 Jahren zugelassen. Die STIKO empfiehlt die Impfung gegen COVID-19 für Personen ab 12 Jahren. Beide hier beschriebenen mRNA-COVID-19-Impfstoffe können für diese Altersgruppe verwendet werden.

Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren: Die STIKO empfiehlt die Impfung mit mRNA-Impfstoffen inzwischen allgemein für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, also nicht mehr im Wesentlichen beschränkt auf Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen, da der Nutzen der Impfung die Risiken überwiegt. Zu Nutzen und Risiken der Impfung siehe auch oben „Wie wirksam ist die Impfung?“ sowie unten „Welche Impfreaktionen können nach der Impfung auftreten?“ und „Sind Impfkomplikationen möglich?“.

### Wer soll nicht geimpft werden?

Kinder bis einschließlich 11 Jahre, für die aktuell kein Impfstoff zugelassen ist, sollen nicht geimpft werden. Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5 °C oder höher) leidet, soll erst nach Genesung geimpft werden. Eine Erkältung oder gering erhöhte Temperatur (unter 38,5 °C) ist jedoch kein Grund, die Impfung zu verschieben. Bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil sollte nicht geimpft werden: Bitte teilen Sie der Impfärztin/dem Impfarzt vor der Impfung mit, wenn Sie Allergien haben. Wer nach der 1. Impfung eine allergische Sofortreaktion (Anaphylaxie) hatte, sollte die 2. Impfung nicht erhalten. Zur Anwendung der COVID-19-mRNA-Impfstoffe in der Schwangerschaft liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die STIKO empfiehlt die generelle Impfung in der Schwangerschaft derzeit nicht – unabhängig von der Art des COVID-19-Impfstoffes. In Einzelfällen kann Schwangeren aber nach Nutzen-Risiko-Abwägung und nach ausführlicher Aufklärung eine Impfung ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® oder Spikevax®) angeboten werden. Bei der Nutzen-Risiko-Abwägung sollten Vorerkrankungen, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf der COVID-19-Erkrankung darstellen, oder Lebensumstände mit einem hohen Risiko, sich mit SARS-CoV-2 anzustecken beachtet werden. Die STIKO hält es für sehr unwahrscheinlich, dass eine Impfung der Mutter während der Stillzeit ein Risiko für den gestillten Säugling darstellt.

### Wie verhalte ich mich vor und nach der Impfung?

Zu anderen Impfungen soll ein Abstand von mindestens 14 Tagen eingehalten werden. Wenn Sie nach einer früheren Impfung oder anderen Spritze ohnmächtig geworden sind, zu Sofortallergien neigen oder andere Reaktionen hatten, teilen Sie dies bitte der Impfärztin/dem Impfarzt vor der Impfung mit. Dann kann sie / er Sie nach der Impfung gegebenenfalls länger beobachten. Bitte teilen Sie der Ärztin/dem Arzt vor der Impfung mit, wenn Sie an einer Gerinnungsstörung leiden oder gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Sie können unter Einhaltung einfacher Vorsichtsmaßnahmen geimpft werden. Es spricht nichts gegen eine Impfung bei Personen mit einer Immunschwäche. Es ist jedoch möglich, dass die Impfung bei diesen Personen nicht so wirksam ist. Bitte teilen Sie der Ärztin/dem Arzt vor der Impfung auch mit, wenn Sie nach einer Impfung in der Vergangenheit eine allergische Reaktion hatten oder Allergien haben. Die Ärztin/der Arzt wird mit Ihnen abklären, ob etwas gegen die Impfung spricht. Es ist ratsam, in den ersten Tagen nach der Impfung außergewöhnliche körperliche Belastungen und Leistungssport zu vermeiden. Bei Schmerzen oder Fieber nach der Impfung (s. „Welche Impfreaktionen können nach der Impfung auftreten?“) können schmerzlindernde / fiebersenkende Medikamente eingenommen werden. Ihre Hausärztin/ Ihr Hausarzt kann Sie hierzu beraten.

**Centrum für Kardiologie,  
Angiologie und  
Diabetologie  
Rhein - Main**

**Dr. med. Predrag Matic**  
Innere Medizin, Kardiologie und  
Diabetologie

**Dr. med. Stephan Bauer**  
Innere Medizin und Kardiologie

**PRAXIS MATIC**  
**Akademische Lehrpraxis**  
der  
Johann Wolfgang Goethe  
**U n i v e r s i t ä t**  
Frankfurt am Main

**Dr. med. Nina Matic**  
Allgemeinmedizin

**Dr. med. Vera Marbun**  
Innere Medizin

**Gabriele Kehl**  
Innere Medizin und  
Rheumatologie

**Dr. med. Juliane Rohlf**  
Allgemeinmedizin und Chirurgie

**Dr. med. Ludmila Bogatyrova**  
Allgemeinmedizin und Geriatrie

**M. Sc. Vera Wagner**  
Psychologische Psychotherapie

**Dipl. Psych. Ana Seiwald**  
Psychologische Psychotherapie

**Dr. med. Sandra Schanz**  
Allgemeinmedizin und Anästhesie

**Ingrid Strotmann**  
Allgemeinmedizin und  
Öffentliches Gesundheitswesen

[www.praxis-matic.de](http://www.praxis-matic.de)

**MVZ Darmstadt**  
Gruberstr. 26  
64289 Darmstadt  
Tel.: 06151/97172-0  
Fax.: 06151/97172-119  
info@praxis-matic.de

**Psychotherapie**  
Borsdorfstr. 42  
64289 Darmstadt

**MVZ Rossdorf**  
Darmstädterstr. 8  
64389 Rossdorf  
Tel.: 06154/695174  
Fax.: 06154/695172  
rossdorf@praxis-matic.de

**MVZ Offenbach Mühlheim**  
Südring 14  
63165 Mühlheim  
Tel.: 06108/9111-0

### Welche Impfreaktionen können nach der Impfung auftreten?

Nach der Impfung mit den mRNA-Impfstoffen kann es als Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff zu Lokal- und Allgemeinreaktionen kommen. Diese Reaktionen treten meist innerhalb von 2 Tagen nach der Impfung auf und halten selten länger als 3 Tage an. Die meisten Reaktionen sind bei älteren Personen etwas seltener als bei jüngeren Personen zu beobachten. Die Impfreaktionen sind zumeist mild oder mäßig ausgeprägt und treten etwas häufiger nach der zweiten Impfung auf. Comirnaty®: Sehr häufig auftretende Impfreaktionen (bei mehr als 10% der Personen) können abhängig vom Alter berichtet werden: Personen ab 16 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 80%), Ermüdung (mehr als 60%), Kopfschmerzen (mehr als 50%), Muskelschmerzen und Schüttelfrost (mehr als 30%), Gelenkschmerzen (mehr als 20%), Fieber und Schwellung der Einstichstelle (mehr als 10%).

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren: Die in den Zulassungsstudien am häufigsten berichteten Impfreaktionen nach Gabe von Comirnaty® waren im zumeist 2-monatigen Beobachtungszeitraum: Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 90%), Ermüdung und Kopfschmerzen (mehr als 70 %), Muskelschmerzen und Schüttelfrost (mehr als 40%), Gelenkschmerzen und Fieber (mehr als 20%). In den Zulassungsstudien, die alle Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer ab 12 Jahren berücksichtigen, wurden folgende Impfreaktionen bei weniger als 10% der Personen berichtet: Häufig (zwischen 1% und 10%) traten Übelkeit und Rötung der Einstichstelle auf. Gelegentlich (zwischen 0,1% und 1%) traten Lymphknotenschwellungen, Schlaflosigkeit, Schmerzen im Impfarm, Unwohlsein, Juckreiz an der Einstichstelle sowie Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. allgemeiner Ausschlag und Juckreiz) auf. Seit Einführung der Impfung wurde außerdem sehr häufig (bei 10% oder mehr) über Durchfall und häufig (zwischen 1% und 10%) über Erbrechen berichtet. Spikevax®: Sehr häufig auftretende Impfreaktionen (bei mehr als 10% der Personen) können abhängig vom Alter berichtet werden: Personen ab 18 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 90%), Müdigkeit (70%), Kopf- und Muskelschmerzen (mehr als 60%), Gelenkschmerzen und Schüttelfrost (mehr als 40%), Übelkeit oder Erbrechen (mehr als 20%), Schwellung oder Schmerzempfindlichkeit der Lymphknoten in der Achselhöhle, Fieber, Schwellung und Rötung an der Einstichstelle (jeweils mehr als 10%). Häufig (zwischen 1% und 10%) wurde über allgemeinen Ausschlag sowie Ausschlag, Rötung oder Nesselsucht an der Einstichstelle berichtet. Gelegentlich (zwischen 0,1% und 1%) trat Juckreiz an der Einstichstelle auf. Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen waren: Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 90%), Kopfschmerzen und Müdigkeit (mehr als 70 %), Muskelschmerzen (mehr als 50 %), Schüttelfrost (mehr als 40%), Schwellung oder Schmerzempfindlichkeit der Lymphknoten in der Achselhöhle und Gelenkschmerzen (mehr als 30%), Übelkeit oder Erbrechen, Schwellung und Rötung an der Einstichstelle (mehr als 20%) sowie Fieber (mehr als 10%).

Folgende Impfreaktionen wurden bei weniger als 10% der Personen (betrifft alle Altersgruppen ab 12 Jahren) berichtet: Häufig (zwischen 1% und 10%) traten Rötung, Ausschlag und Nesselsucht an der Impfstelle, teilweise verzögert sowie allgemeiner Ausschlag auf. Gelegentlich (zwischen 0,1% und 1%) kam es zu Juckreiz an der Einstichstelle und zu Schwindel.

Centrum für Kardiologie,  
Angiologie und  
Diabetologie  
Rhein - Main

Dr. med. Predrag Matic  
Innere Medizin, Kardiologie und  
Diabetologie

Dr. med. Stephan Bauer  
Innere Medizin und Kardiologie

**PRAXIS MATIC**  
Akademische Lehrpraxis  
der  
Johann Wolfgang Goethe  
Universität  
Frankfurt am Main

Dr. med. Nina  
Matic Allgemeinmedizin

Dr. med. Vera Marbun  
Innere Medizin

Gabriele Kehl  
Innere Medizin und  
Rheumatologie

Dr. med. Juliane Rohlfis  
Allgemeinmedizin und Chirurgie

Dr. med. Ludmila Bogatyrova  
Allgemeinmedizin und Geriatrie

M. Sc. Vera Wagner  
Psychologische Psychotherapie

Dipl. Psych. Ana Seiwald  
Psychologische Psychotherapie

Dr. med. Sandra Schanz  
Allgemeinmedizin und Anästhesie

Ingrid Strotmann  
Allgemeinmedizin und  
Öffentliches Gesundheitswesen

[www.praxis-matic.de](http://www.praxis-matic.de)

MVZ Darmstadt  
Gruberstr. 26  
64289 Darmstadt  
Tel.: 06151/97172-0  
Fax.: 06151/97172-119  
info@praxis-matic.de

Psychotherapie  
Borsdorfstr. 42  
64289 Darmstadt

MVZ Rossdorf  
Darmstädterstr. 8  
64389 Rossdorf  
Tel.: 06154/695174  
Fax.: 06154/695172  
rossdorf@praxis-matic.de

MVZ Offenbach Mühlheim  
Südring 14  
63165 Mühlheim  
Tel.: 06108/9111-0

## Sind Impfkomplicationen möglich?

Impfkomplicationen sind über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belasten. In den umfangreichen klinischen Prüfungen vor der Zulassung wurden nach Gabe der mRNA-Impfstoffe selten (zwischen 0,1% und 0,01%) Fälle von akuter Gesichtslähmung beobachtet (Comirnaty®: 4 Fälle nach Gabe des Impfstoffs; Spikevax®: 3 Fälle nach Gabe des Impfstoffs und 1 Fall in der Kontrollgruppe). In allen Fällen bildete sich die Gesichtslähmung nach einigen Wochen zurück. Diese Gesichtslähmungen stehen möglicherweise im ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung. Überempfindlichkeitsreaktionen wurden in seltenen Fällen (zwischen 0,1% und 0,01%) beobachtet: Nesselsucht oder Gesichtsschwellung nach Gabe von Comirnaty® und 2 Fälle von Gesichtsschwellung nach Gabe von Spikevax®. Seit Einführung der Impfung wurden in sehr seltenen Fällen anaphylaktische Reaktionen (allergische Sofortreaktionen) berichtet. Diese traten kurz nach der Impfung auf und mussten ärztlich behandelt werden. Ebenfalls seit Einführung der Impfung wurden nach Gabe der mRNA-Impfstoffe sehr selten Fälle von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen (Myokarditis und Perikarditis) beobachtet. Diese Fälle traten hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung, häufiger nach der 2. Impfung und häufiger bei jüngeren Männern auf. Einige ältere Personen bzw. Personen mit Vorerkrankungen verstarben. Bisher wurden in Deutschland mehrere Millionen Dosen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe verabreicht. Die bisher an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldeten unerwünschten Reaktionen nach Impfung mit mRNA-Impfstoffen waren vor allem vorübergehende Lokal- und Allgemeinreaktionen. Anaphylaktische Reaktionen (allergische Sofortreaktionen) wurden sehr selten nach Impfung mit den beiden mRNA-Impfstoffen berichtet. Fälle von Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen sind sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen ebenfalls sehr selten aufgetreten: Betroffen waren überwiegend männliche Jugendliche und junge Männer in den ersten 14 Tagen nach der 2. Impfstoffdosis und die Erkrankungen verliefen zumeist mild. Grundsätzlich können – wie bei allen Impfstoffen – in sehr seltenen Fällen eine allergische Sofortreaktion bis hin zum Schock oder andere auch bisher unbekannte Komplikationen nicht ausgeschlossen werden. Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die oben genannten schnell vorübergehenden Lokal- und Allgemeinreaktionen überschreiten, steht Ihnen Ihre Hausärztin/Ihr Hausarzt selbstverständlich zur Beratung zur Verfügung. Bei schweren Beeinträchtigungen, Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit oder Herzklopfen begeben Sie sich bitte umgehend in ärztliche Behandlung.

**Centrum für Kardiologie,  
Angiologie und  
Diabetologie  
Rhein - Main**

**Dr. med. Predrag Matic**  
Innere Medizin, Kardiologie und  
Diabetologie

**Dr. med. Stephan Bauer**  
Innere Medizin und Kardiologie

**PRAXIS MATIC**  
**Akademische Lehrpraxis  
der  
Johann Wolfgang Goethe  
Universität  
Frankfurt am Main**

**Dr. med. Nina  
Matic** Allgemeinmedizin

**Dr. med. Vera Marbun**  
Innere Medizin

**Gabriele Kehl**  
Innere Medizin und  
Rheumatologie

**Dr. med. Juliane Rohlfz**  
Allgemeinmedizin und Chirurgie

**Dr. med. Ludmila Bogatyrova**  
Allgemeinmedizin und Geriatrie

**M. Sc. Vera Wagner**  
Psychologische Psychotherapie

**Dipl. Psych. Ana Seiwald**  
Psychologische Psychotherapie

**Dr. med. Sandra Schanz**  
Allgemeinmedizin und Anästhesie

**Ingrid Strotmann**  
Allgemeinmedizin und  
Öffentliches Gesundheitswesen

[www.praxis-matic.de](http://www.praxis-matic.de)

**MVZ Darmstadt**  
Gruberstr. 26  
64289 Darmstadt  
Tel: 06151/97172-0  
Fax.: 06151/97172-119  
[info@praxis-matic.de](mailto:info@praxis-matic.de)

**Psychotherapie**  
Borsdorfstr. 42  
64289 Darmstadt

**MVZ Rossdorf**  
Darmstädterstr. 8  
64389 Rossdorf  
Tel.: 06154/695174  
Fax.: 06154/695172  
[rossdorf@praxis-matic.de](mailto:rossdorf@praxis-matic.de)

**MVZ Offenbach Mühlheim**  
Südring 14  
63165 Mülheim  
Tel.: 06108/9111-0

Es besteht die Möglichkeit, Nebenwirkungen auch selbst zu melden:  
<https://nebenwirkungen.bund.de>

In Ergänzung zu diesem Aufklärungsmerkblatt bietet Ihnen Ihre Impfärztin / Ihr Impfarzt ein Aufklärungsgespräch an.

**Anmerkungen:**

Ort /Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Ärztin / Arzt \_\_\_\_\_

Unterschrift der zu impfenden Person \_\_\_\_\_

Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zu impfenden Person:

\_\_\_\_\_

**Unterschrift der zur Einwilligung berechtigten Person  
(Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn)**

**Centrum für Kardiologie,  
Angiologie und  
Diabetologie  
Rhein - Main**

**Dr. med. Predrag Matic**  
Innere Medizin, Kardiologie und  
Diabetologie

**Dr. med. Stephan Bauer**  
Innere Medizin und Kardiologie

**PRAXIS MATIC**  
**Akademische Lehrpraxis  
der  
Johann Wolfgang Goethe  
U n i v e r s i t ä t  
Frankfurt am Main**

**Dr. med. Nina  
Matic** Allgemeinmedizin

**Dr. med. Vera Marbun**  
Innere Medizin

**Gabriele Kehl**  
Innere Medizin und  
Rheumatologie

**Dr. med. Juliane Rohlf**  
Allgemeinmedizin und Chirurgie

**Dr. med. Ludmila Bogatyrova**  
Allgemeinmedizin und Geriatrie

**M. Sc. Vera Wagner**  
Psychologische Psychotherapie

**Dipl. Psych. Ana Seiwald**  
Psychologische Psychotherapie

**Dr. med. Sandra Schanz**  
Allgemeinmedizin und Anästhesie

**Ingrid Strotmann**  
Allgemeinmedizin und  
Öffentliches Gesundheitswesen

[www.praxis-matic.de](http://www.praxis-matic.de)

**MVZ Darmstadt**  
Gruberstr. 26  
64289 Darmstadt  
Tel.: 06151/97172-0  
Fax.: 06151/97172-119  
[info@praxis-matic.de](mailto:info@praxis-matic.de)

Psychotherapie  
Borsdorfstr. 42  
64289 Darmstadt

**MVZ Rossdorf**  
Darmstädterstr. 8  
64389 Rossdorf  
Tel.: 06154/695174  
Fax.: 06154/695172  
[rossdorf@praxis-matic.de](mailto:rossdorf@praxis-matic.de)

**MVZ Offenbach Mülheim**  
Südring 14  
63165 Mülheim  
Tel.: 06108/9111-0